



# 2주이상 기침하면 결핵검진

## 결핵(Tuberculosis)이란?

결핵균(*Mycobacterium tuberculosis*)의 감염에 의해 생기는 호흡기 감염병입니다. 주로 폐에 발생하지만 다른 신체부위에도 질환을 일으킬 수 있습니다.




## 결핵의 감염경로

- 전염성 결핵환자의 기침, 재채기 또는 대화 등으로 배출된 결핵균이 공기를 통해 다른 사람 폐로 들어가게 되면 결핵균에 감염됩니다.



## 결핵의 증상, 진단과 치료



## 결핵예방접종(BCG 접종) 바로 알기

- 우리나라는 모든 신생아(생후 4주 미만)에게 BCG 접종을 권고하고 있습니다.
- BCG 접종은 소아에게 발생 가능성이 높은 중증 결핵 예방을 위한 것으로, 결핵이 평생 동안 예방되는 것은 아닙니다.






결핵예방수칙  
02

기침할 땐  
옷소매로!

결핵과 잠복결핵감염 바로알기

|        | 결핵                   | 잠복결핵감염        |
|--------|----------------------|---------------|
| 증상 유무  | 2주 이상 기침, 발열, 체중감소 등 | 증상 없음         |
| 전염성 여부 | 기침, 대화를 통해 공기 중으로 전파 | 전염성 없음        |
| 환자 여부  | 환자 (반드시 치료)          | 환자 아님 (치료 권고) |
| 신고 의무  | 신고 (법적 의무)           | 해당 없음         |

 잠복결핵감염자는 면역력이 약해지면 결핵으로 발병할 수 있어 검진과 치료로 결핵발병을 예방하는 것이 중요합니다.

결핵 ZERO

1339  
질병관리본부 콜센터

결핵예방은  
검진이지~EASY!

2주이상  
기침하면  
결핵검진

 질병관리본부  
KCDC