
코로나바이러스감염증-19 선별진료소 운영 안내

2020. 11. 18.

**중앙사고수습본부
중앙방역대책본부**

I. 개요

※ 동 지침은 코로나바이러스감염증-19 선별진료소 운영에 대한 기본 가이드라인으로서, 기본 수칙에 따른 세부사항(예: 운영시간, 운영팀 지원인력 구성 등)은 기관별 상황에 따라 적합하게 적용 가능

1. 선별진료소 운영 목적

- 코로나바이러스감염증-19 (의심)환자가 의료기관 내로 유입되거나 의료진이 노출되어 발생할 수 있는 의료기관 내 전파위험을 차단하기 위함이다.

2. 선별진료소 운영 기본수칙

- 1) 선별진료소 안내문(배너, 포스터 등)을 부착한다.
- 2) 개인보호구를 구비한다.
: 마스크(수술용, 보건용), 안면보호구(고글 등), 일회용 긴팔가운, 일회용 장갑, 레벨D 보호구, 덧신 등
- 3) 선별진료소 운영에 참여하는 모든 직원은 개인보호구 사용과 감염예방 수칙을 준수한다.
이를 위해 직원에 대한 교육과 훈련을 사전에 제공하고 평가한다.
- 4) 선별진료소 운영팀을 구성하고 역할분장을 한다.

(선별진료소 역할분장 예시)

구 분	업 무
환자 진료	· 환자의 노출력, 증상 및 징후 확인 · 신고대상 환자 확인되면 관할보건소에 제1급감염병 신종감염병증후군 의사환자 발생 신고
진료 지원	· 환자관리 수칙, 안내 포스터 및 유인물 제작 · 의료기관 내 코로나바이러스감염증-19 환자 관리를 위한 교육시행 · 선별진료소의 보호구와 물품(손소독제 등) 관리 및 진료실 청소 등 환경관리 · 선별진료소의 공기 조화 관리
행정 지원	· 예진실 접수처 관리 지원 · 직원 배치, 근무 규정 등 제반 행정 지원

3. 선별진료소의 설치

1) 설치 장소

- 응급실 또는 외래 진입 전 외부공간에 설치를 권고하며, 부득이한 경우 의료기관 내 별도로 분리된 시설을 선별 진료소로 이용

2) 선별진료 안내

- 코로나바이러스감염증-19 홍보 포스터, 배너, 안내문 등을 설치한다.
 - (안내소) 병원입구, 응급실 입구
 - (선별진료소) 응급실 주변 등(기관 사정에 따라 변경)
- 응급실 또는 외래 진입 전 코로나바이러스감염증-19 의심환자를 선별진료소로 안내하며, 필요시 안내 요원을 배치한다.

■ 환자 안내 시 준수사항

- 직원은 마스크(KF94 이상)와 일회용 장갑을 착용하고, 환자와 2m 떨어진 상태에서 진료소로 안내
- 다른 보호자/환자들과의 접촉을 최대한 차단

3) 선별진료소에 구비할 사항

- 방문자 대기실, 진료실 및 코로나바이러스감염증-19 의심환자를 위한 임시 격리공간을 갖추어야 한다.
- 검체를 개별 기관에서 채취하는 경우 검체 채취를 위한 공간(격리 병실 또는 선별진료소 내 별도 공간)을 마련하여야 한다.
- 검체 채취를 위한 숙련된 전문인력 확보
- 마스크(수술용, KF94 또는 동급 이상)와 손소독제, 안면보호구, 일회용 가운, 일회용 장갑, 덧신 및 전신보호복을 비치한다.
- 가능하면 간이음압시설을 설치한다.

4. 선별진료소 운영 시 동선관리

1) 동선관리의 목적

- 코로나바이러스감염증-19 의심환자가 의료진이나 일반 환자에게 노출되어 발생할 수 있는 의료기관 내 전파 위험을 차단하기 위함이다.

2) 동선관리의 원칙

① 일반 환자 및 의료진과 분리

A. 코로나바이러스감염증-19 의심환자가 의료진 및 일반 환자와 접촉하지 않도록 동선을 마련한다.

B. 환자 이동 시 환자에게 수술용 마스크(환자 상태가 가능한 경우 KF94 이상 가능)를 착용 시키며 필요시 일회용 가운, 모자, 일회용 장갑도 착용시킨다.

② 해당 의료기관 내에 음압 격리 시설이 마련되어 있는 경우 코로나바이러스감염증-19 의심환자가 별도로 지정된 통로를 통하여 (가능한 한 응급실이 포함되지 않은 동선 이용) 음압 격리실로 바로 이동할 수 있도록 한다.

③ 코로나바이러스감염증-19 의심환자의 경우 별도로 분리된 코로나바이러스감염증-19 진료 공간을 이용한다.

④ 코로나바이러스감염증-19 의심환자 이동 시 보호자와 동행한 경우, 보호자에게도 보건용 마스크와 긴팔 가운(필요시 보호구 종류는 추가 가능)을 착용시킨다.

II. 선별진료소 (의심)환자관리 절차

□ 신고 및 대응을 위한 사례 정의

○ 사례정의

- ▶ 진단을 위한 검사 기준 : 코로나19 유전자(PCR) 검출, 바이러스 분리
- ▶ 주요 임상증상 : 발열(37.5°C 이상), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각소실 또는 폐렴 등

○ 확진환자

: 임상양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염병 병원체 감염이 확인된 자

○ 의사환자

: 확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자

○ 조사 대상 유증상자(Patient Under Investigation, PUI)

- ① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자(PUI 1)
- ② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자(PUI 2)
- ③ 코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있어 진단검사가 필요하다고 인정되는 자(PUI 3)

• 다음에 해당하는 조사대상 유증상자의 경우 적극적 검사 권고(조사대상 유증상자 1로 신고)

- 가족(동거인) 또는 동일시설 생활자가 코로나19 임상증상이 있는 경우
- 해외에서 입국한지 14일 이내의 가족(동거인), 친구, 지인과 접촉한 경우
- 지역사회 유행 양상 고려하여 확진자가 발생한 기관 또는 장소 방문력이 있는 경우
- 응급선별검사 또는 신속항원검사 결과가 양성인 경우

※ 신속항원검사 안내는 사용승인 허가 후 별도 공지

1. 선별진료소 환자분류

1) 환자의 정보 확인, 임상 증상과 징후 및 (필요시) 검사 등을 통해 사례정의에 따라 환자를 분류한다.

① 수진자자격조회/DUR/ITS 정보를 이용하여 접수자가 질문하거나 의사가 문진을 통해 국내외 여행(방문)력 및 확진환자 접촉력 등 확인(붙임 1 참조)

* DUR/ITS, 수진자 자격조회를 통해 해외방문 입국자 전수 해외여행력을 제공하고 있음(20.3.18. 기준)

* DUR(Drug Utilization Review) : 의약품안전사용서비스, ITS(International Traveler Information System)
: 해외여행력 정보제공 프로그램

- ② 의사의 소견에 따라 **코로나19 임상증상** 등 **코로나19가 의심**되는지 확인
- ③ **코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성**이 있는지 확인
- ④ 의료기관에서 **코로나바이러스감염증-19** 또는 **코로나바이러스감염증-19/인플루엔자 동시검사**가 의뢰되었는지 확인

구분	사례 정의
의사환자	확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자
조사 대상 유증상자	① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자 ② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자 ③ 코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있어 진단 검사가 필요하다고 인정되는 자

2) 사례 정의에 **해당하는 경우는 선별진료소 진료** 안내. 사례정의에 **해당하지 않는 경우는 진료 필요시 일반진료**(응급실, 외래 등) 안내

* (의심)환자 분류 및 격리 시 감염관리

- (의심)환자: 마스크(수술용 또는 보건용, 환자가 호흡곤란이 없고 상태가 가능한 경우 KF94 이상 가능) 착용
- 접수자: 보건용 마스크(N95 또는 KF94 동급 이상), 일회용 장갑 등 착용

2. 사례 분류에 따른 대응 절차¹⁾

1) 의사환자 발생 시 대응 절차

- ① (**환자 이동**) 의사환자를 격리공간 또는 (격리공간이 없는 경우) 독립된 공간으로 이동
- ② (**검사시행**) 확진검사(코로나19(PCR) 검사) 시행
 - 환자가 발열·호흡기 증상으로 방문한 경우에는 의사의 소견에 따라 적극적인 검사 시행(PUI 1대상)
 - 인플루엔자가 의심되거나 의료기관에서 동시검사를 의뢰했을 때, **코로나19 / 인플루엔자 동시검사 시행**(동시검사가 가능한 선별진료소인 경우에 해당)

1) 코로나바이러스감염증-19 대응지침(지자체용) 제9-3판

③ (발생 신고) 관할보건소에 제1급감염병 신종감염병증후군 의사환자 발생 신고*

* 환자분류란에 의사환자를 체크하였어도 신고서의 비고(특이사항)란에 “의사환자”를 반드시 기입

④ (환자 격리) 고위험군, 중증도 분류에 의해 시설 또는 병원격리(시·도 환자관리반)

* 입원치료 통지서를 발급하고, 자가격리 동안 준수해야 할 생활수칙 및 코로나19 검사 절차 안내 등(코로나바이러스감염증-19 대응지침(지자체용) 제9-3판, 서식3, 부록 3,4,5)

2) 조사대상 유증상자 대응 절차

① (환자 이동) 조사대상 유증상자를 격리공간 또는 (격리공간이 없는 경우) 독립된 공간으로 이동

② (검사시행) 확진검사(코로나19(PCR) 검사) 시행

③ (발생 신고) 관할보건소에 제1급감염병 신종감염병증후군 조사대상 유증상자 발생 신고*

* 신고서의 비고(특이사항)란에 의사환자 선택 후 반드시 「조사대상 유증상자」의 구분 입력

* 응급선별검사 또는 신속항원검사 결과 양성인 경우 비고(특이사항)란에 반드시 「조사대상 유증상자1」 및 「응급선별검사 또는 신속항원검사 결과 양성」 함께 입력

예시)

[조사대상 유증상자 구분]

- 조사대상 유증상자 1: 의사 소견에 따라 코로나19 감염 의심자
- 조사대상 유증상자 2: 해외 방문력이 있는 자 중 유증상자
- 조사대상 유증상자 3: 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있는 자
- 조사대상 유증상자 1, 응급선별검사 또는 신속항원검사 결과 양성인 경우

* 조사대상 유증상자 2의 경우 보건소 보고정보에 해외유입 사항 추가 입력

▶ 보건소 보고정보 ※보건소에서만 보이는 항목이므로 보건소에서 확인 후 입력하여 주시기 바랍니다. (소속기관은 감염병환자등의 소속기관을 말합니다.)

국적 (외국인만 해당합니다)	<input type="text"/>	검색
환자의 소속기관명	<input type="text"/>	
환자의 소속기관주소	시도 <input type="text"/>	시군구 <input type="text"/> 읍면동 <input type="text"/> 상세주소 <input type="text"/>
추정감염지역	<input type="radio"/> 국내 <input checked="" type="radio"/> 국외	국가명 <input type="text"/> 검색
체류기간	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> ~ <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	입국일 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> * 추정감염지역이 국외인 경우만 해당

④ 보건교육 시행

○ 검사 대상자 안내사항

1. 검사 직후 다른 장소를 들르지 말고 자택으로 바로 가셔야 합니다.
2. 귀가시 마스크를 착용하고 자차, 택시 등을 이용하여 주시고, 버스, 전철 등과 같은 다수가 이용하는 대중교통수단 이용은 삼가하여 주시기 바랍니다.
3. 검사결과 확인 전까지 외출을 자제하시고, 타인과의 접촉을 피해 주시기 바랍니다.
4. 자택내에서도 가족간 감염 예방을 위해 마스크 착용 및 격리 수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.
5. 증상 발생 및 악화 시 보건소 또는 질병관리청 콜센터(☎1339, 지역번호+120)우선 문의

○ (자제해야 할 일) 외출, 타인과의 접촉(식사포함), 대중교통 이용, 다중이용시설 이용 등

○ (해야 할 일)

- 개인위생을 위해 손 씻기 강조, 기침예절 준수
- 타인과 대화 시 2m 간격 유지하고 간격 유지가 안 된다면 마스크 착용 권고
- 불가피하게 의료기관 방문 시 해외 방문력, 국내 집단발생 관련여부, 직업 등 알리기
- 증상 발생 및 악화 시 질병관리청 콜센터(☎1339, 지역번호+120) 또는 보건소로 우선 문의

- 확진검사 결과에 따른 조치는 그림 1(선별진료소 대응절차) 참고

- 코로나19/인플루엔자 동시 검사 시행 결과에 따른 조치는 부록 2 참고

※ 검사 결과 음성이라도 입국일/증상발현일로부터 14일간 보건교육 내용 준수 권고




그림 1. 선별진료소 대응 절차

3. 검체 채취 및 검사 의뢰

상세 내용은 참고 2.(코로나바이러스감염증-19 유전자(PCR)검사 안내) 참조

1) 검체 채취

① **(채취 장소)** 선별진료소 또는 의료기관 내 다른 공간과 격리된 검체 채취 공간

* 단, 자가격리일 경우 격리장소에 따라 채취장소 변동 가능성 있음

② **(검체종류)** 상기도(구·비인두 도말 혼합) 검체, 기침이나 가래가 있는 경우 하기도 검체

* 경증인 자 : 상기도 검체만 채취하여 검사 의뢰

- **(상기도 검체)** 상기도 검체는 비인두도말물과 구인두도말물을 동시에 채취하여 하나의 바이러스용 수송배지에 담아 검체시험의뢰서(서식 1)와 함께 수송

- **(하기도 검체)** 환자 스스로 구강 내를 깨끗한 물로 세척한 후, 멸균용기(가래통 등)에 타액 등이 포함되지 않도록 깊이 기침하여 채취

2) 검체포장

- 채취된 검체가 포함된 1차 용기를 소독처리(70% ethanol)한 후 라벨 작성

* 병원명, 검체종류, 채취일, 환자명, 성별, 나이 등의 정보 표시

- 소독 처리된 1차 용기를 흡수제(종이타올 등)로 감싼 후 2차 용기에 넣음

- 2차 용기의 뚜껑을 단단히 잠근 후 3차 용기에 넣음

- 검체 시험의뢰서를 3차 용기 뚜껑 사이에 넣은 후 포장

- 3차 수송용기 겉면에 보내는 사람, 받는 사람, 응급상황 시 연락처를 기재

- 3차 수송용기를 아이스박스에 넣은 후 냉매제(아이스팩)를 용기 주변 4면에 삽입

- 포장된 아이스박스의 겉면에 감염성 물질 표시, UN 3373 표시, 방향 표시, 보내는 사람, 받는 사람, 응급상황 시 연락처 등을 기재

○ (주의 사항) 검체 채취 시, KF94 또는 동급의 호흡기보호구, 일회용 장갑, 일회용 긴팔 가운 또는 전신보호복, 고글 또는 안면보호구(필요시 불투과성 일회용 앞치마 추가 착용) 등의 개인보호구를 필수적으로 착용 및 검체 채취 후 소독 필수


* 「표 1. 코로나바이러스감염증-19 대응 상황별 개인보호구 권장 범위」 참고

3) 검사의뢰

수탁검사기관 또는 기관 내 검사실로 검체 이송

※ 「질병보건통합관리시스템」의 ‘감염병관리통합정보지원 - 검사의뢰’ 메뉴에 검사의뢰 내용을 입력

< 선별진료소 검체 이송 체계 >



< 검체 이송 관련 유의사항 >

- 1) 보건소에서 역학조사 검체 또는 응급검체 이송 시는 검체 수거 일정에 상관없이 즉시 이송
- 2) 검체 채취 가능 보건소는 규칙적 검체 수거 일정(최소 2-3회/일)을 정하여 검체 이송
- 3) 의료기관에서 민간수탁기관으로 검체 의뢰 시, 가능한 빠른 시간 내 이송
- 4) 의료기관 내 자체검사 건수 과다 시, 민간수탁기관 검사 의뢰 가능

* 검체 채취 시행 보건소 선별기준 (예시)

- 의료 접근성 낙후 지역의 보건소 필수 포함
(예: 의료기관이 거의 없는 섬 지역, 의료기관 선별진료소 접근성 낮은 지역 등)
- 선별진료소 시설구비, 숙련된 인력배치 보건소 중 검체 채취 시행 가능 기관 신청 보건소

4. 검사 결과 통보

- 1) 선별진료소는 코로나19 또는 코로나19/인플루엔자 동시검사 결과를 유선 또는 문자 등으로 수검자에게 통보
- 2) 의료기관에서 의뢰된 검사를 수행하고 수검자가 검사결과 제공 동의서에 동의한 경우에는 검사를 의뢰한 의료기관에도 결과를 통보(유선 또는 문자 등)

안내문자 예시

< 코로나 19 음성, 인플루엔자 양성시 >

000님 0월 0일 검사한 코로나 19검사 결과는 음성, 인플루엔자 검사 결과는 양성입니다. 현재 의료기관에서 항바이러스제를 처방받아 복용중인 경우, 지속 복용하시고(총 5일), 항바이러스제를 처방받아 복용하고 있지 않은 경우, 가까운 의료기관에 가서 진료를 받으시기 바랍니다.

< 코로나 19 음성, 인플루엔자 음성시 >

000님 0월 0일 검사한 코로나 19 검사는 결과는 음성, 인플루엔자 검사 결과는 음성입니다.

임상증상이 있으신 경우, 가까운 의료기관에서 진료를 받으시기 바랍니다. 현재 의료기관에서 항바이러스제를 처방받아 복용중인 경우, 항바이러스제 복용에 대해 처방한 의사에게 문의하시기 바랍니다.

5. 선별진료소 감염관리

1) 코로나19 의심환자에게 수술용 마스크(환자 상태가 가능한 경우 KF94이상 가능)를 착용하도록 지도한다.

2) 환자 진료에 참여하는 의료진은 마스크(KF94 이상), 일회용 장갑, 긴팔 가운, 고글 또는 안면보호구를 착용하며, 호흡기 비말을 생성하는 시술 시에는 레벨D 수준의 보호구 착용을 권고한다. 진료 전후에 손위생(비누와 물로 손씻기 또는 손소독)을 한다.

① 진료 중 신체, 체액, 혈액 및 호흡기 분비물 접촉에 유의

② 체온계 등 사용 시 물품은 최대한 환자 개인용으로 사용

③ 진료 시 가능한 한 일회용 기구를 사용하고 사용 후 적절히 폐기하며* 재사용하는 경우는 철저히 소독한다.

* 『폐기물관리법 제4조(의료폐기물의 종류)』에 따라 감염병으로부터 타인을 보호하기 위하여 격리된 사람에 대한 의료행위에서 발생한 일체의 폐기물로 조직물류, 병리계, 손상성 및 오염 세탁물류(환자 침구, 환자복, 분비물이 묻은 린넨류) 등을 모두 포함

3) 선별진료소 환경 소독 실시

① (소독 장소) 환자 동선을 따라 출입문 손잡이, 대기 의자, 접수창구, 진료실 의사(또는 침상) 등

② (환경소독제) 차아염소산나트륨(1000ppm 권장), 알코올(국소 표면인 경우) 등이 포함되며, 살균력이 입증된 바이러스용 소독제*를 사용할 수 있다.

* 코로나바이러스용 환경부 승인 소독제, WHO(세계보건기구), ECDC(유럽질병예방통제센터) 등에서 제시한 소독제로 환경부 승인·신고 제품을 사용하며 제품별 사용량·사용방법·주의사항 준수

* (소독제 목록 및 정보제공) 환경부 초록누리 <http://ecolife.me.go.kr>

【환경소독제 사용 시 유의사항】 2)

- ① 환경부의 승인·신고 제품 여부 등 정보 확인 후 소독제 선택
 - * 초록누리 <http://ecolife.me.go.kr>
- ② 환경소독제 사용시 유효기간 확인, 제품별 안전 사용방법, 주의사항 등 제조사 권장사항*을 반드시 준수하고, 제조업체의 설명서에 따라 희석액 준비
 - * 희석배율, 접촉시간, 적용 대상 등
- ③ 차아염소산나트륨용액을 사용하는 경우 주의사항 참조
 - * 소독 직전에 희석하여 준비하고, 처리시간은 유효농도 0.1%(1,000ppm)기준 1분 이상 유지필요
 - * 암모니아 또는 다른 소독제와 혼합 금지
- ④ 소독제를 분사하는 소독방법은 감염원 에어로졸 발생·흡입 위험을 증가시키고 소독제와 표면의 접촉범위가 불분명하여 소독효과가 미흡하므로 표면 소독에 적용하지 않음
 - * 소독제의 제품설명서 사용방법이 분무/분사방식인 경우, 일회용 천(티올)에 소독제를 분무/분사하여 적신 후 표면을 닦음
- ⑤ 소독제 유해성 정보를 반드시 확인하고 사용에 유의할 것
- ⑥ 서로 다른 소독제를 섞지 말고, 가연성 물질에 가까이 두지 않으며, 환기가 잘 되는 곳에서 사용
- ⑦ 시간이 지나면 소독 효과가 감소 할 수 있으므로 필요한 만큼만 희석하여 바로 사용하며 잔량은 보관하지 말고 바로 폐기
- ⑧ 유아의 손에 닿지 않도록 유의하며 보관 장소, 보관 방법에 주의

- 차아염소산나트륨(원액농도 5%) 사용시 희석액 만드는 법(예시)

최종 염소 농도	희석액 만드는 방법
0.1% (1,000ppm)*	빈 생수통 500mL에 10mL의 원액을 붓고, 냉수를 500mL까지 채우고 섞는다.
0.5% (5,000ppm)	빈 생수통 500mL에 50mL의 원액을 붓고, 냉수를 500mL까지 채우고 섞는다.

* 원액 필요량 계산법: 희석액 제조량 x 최종 염소농도 ÷ 제품 원액농도, (예시) 500mlx0.1÷5=10ml

* 환자 혈액·체액 오염 : 차아염소산나트륨 희석액 5,000ppm

* 차아염소산나트륨 사용이 적합하지 않은 표면(예 : 금속)은 알코올(70%) 사용

6. 선별진료소 구역별 준수사항

1) 출입구 안내

- ① 호흡기 증상 확인 및 체온 측정 인력은 긴팔가운과 일회용 장갑, 마스크(KF94 이상)를 착용한다.
- ② 선별진료소로 환자를 안내하는 경우 2m 이상 떨어져서 안내 하도록 한다.

2) 코로나바이러스감염증-19 대응 지침(지자체용) 제9-3판 IX.환경관리

- ③ 선별진료소로 안내할 환자에 대해서는 수술용 마스크 (환자가 가능한 경우 KF94 이상)를 착용시켜 진료 대기실로 이동시킨다.

※ 선별 진료소까지 이동을 도와줘야 하는 경우 (보호자가 동행한 경우 포함, 보호복 및 일회용 장갑, 마스크(KF94 이상) 등을 착용하고 내원객을 선별진료소로 안내한다. (필요시 휠체어 사용)

2) 호흡기 증상-발열자 대기실

- 환자가 대기하는 동안 수술용 마스크(환자가 가능한 경우 KF94 이상)를 착용하고 환자 간 1m 이상의 간격을 유지한다.

3) 검체 채취 장소

- ① (공간 분리) 검체 채취 장소는 대기실 또는 진료실 등 타 구역과 분리된 공간으로 한다.
- ② (환기) 검체 채취로 인한 호흡기 에어로졸 발생 시술시 감염을 방지할 수 있도록 음압설비를 갖춘다. 음압설비가 없는 경우 사용 후 창문을 열어 충분히 환기를 하거나, 사람의 이동이 없는(통제된) 야외 장소에서 검체를 채취한다.
- 음압설비를 갖춘 경우 출입구나 창문 등은 출입시를 제외하고는 닫아둔다.
 - 음압이 아닌 자연환기인 경우 출입구 및 창문은 상시 열어두어 환기를 최대화한다.
- ③ (소독) 검체 채취 후 환자가 접촉하거나 비말 오염이 가능한 거리 이내 표면은 소독한다.
- 검체 채취장소는 표면 소독을 적절히 시행 후 다시 사용하며, 환기 시간은 환기요건(환기방법, 자연환기의 경우 창문의 수와 위치, 기상 등)에 따른 환기횟수* 등을 고려하여 판단이 필요하다.

4) 환자 이송

- ① 환자(의심환자) 이송 시 모든 접촉자는 마스크(KF94 이상), 일회용 장갑, 긴팔 가운 등을 착용해야 한다.
- ② 환자(의심환자) 도착 전에 환자 이송 장소에 사전 연락을 취하여 환자를 대비하도록 한다.
- ③ 이송요원 주의사항
- 이송요원은 적절한 개인보호구*를 착용한다.
- * 이송요원 : 전신보호복(덧신포함), KF94 동급의 호흡기보호구, 일회용 장갑, 고글(또는 안면보호구)
- 모든 환자(의심환자)와 접촉하는 경우 일회용 장갑을 착용해야 한다.
 - 직접적으로 환자(의심환자)와 접촉하는 경우 일회용 가운을 착용해야 한다.
 - 환자(의심환자)와 2m 이내에서 일을 하는 경우 보호 안경(고글 등)을 착용 한다.
 - 마스크(KF94 이상)는 착용 전에 잘 맞는지 확인하고 안면에 밀착하여 공기가 새는 곳이

없도록 한다.

④ 환자(의심환자)에 대한 관리는 다음과 같은 원칙을 지켜야 한다.

- 환자(의심환자)에게 보건용 마스크(환자 상태가 가능한 경우 KF94이상 가능)를 착용시킨다.
- 이송 도중 산소 공급이 필요한 경우 non-rebreather 안면마스크를 통해 산소를 공급할 수 있다.

* 자연환기시 환기 횟수와 환기율 및 환기횟수에 따른 비말핵 농도의 감소³⁾

▼ 자연환기시 환기횟수 및 환기율		
열기 정도	환기횟수(ACH)	환기율(Ventilation rate(l/s))
창문 열기(100%)+출입문 열기	37	1300
창문 열기(50%)+출입문 열기	28	975
창문 열기(100%)+출입문 닫기	4.2	150

(풍속 1m/s, 길이 7m×너비 6m×높이 3m 면적의 방, 창문 1.5×2m², 출입문 1×2m² 최소개방 (smallest opening조건에서의 추정치)

▼ 환기율과 시간에 따른 비말핵농도의 감소

시간(분)	환기횟수(ACH) (%)			
	6	12	18	24
0	100.00	100.00	100.00	100.00
10	37.00	13.50	4.98	1.83
20	13.50	1.83	0.25	0.03
50	0.67	0.00	0.00	0.00
60	0.25	0.00	0.00	0.00

ACH, air changes per hour.

※ 코로나바이러스의 환경 내 평균 생존반감기는 30분~1시간으로 보고⁴⁾, 시간당 12회 공기순환 조건에서 30분 이상 경과 후 1% 미만의 공기만 잔류됨⁵⁾

7. 개인보호구의 사용

1) 개인보호구의 권장범위*에 따라 적합한 보호구를 선택한다.

- (의심)환자와의 접촉 형태 및 진료상황과 행위(직접 접촉여부, 에어로졸 생성 처치여부 등)에 따라 선택

*「표 1. 코로나바이러스감염증-19 대응 상황별 개인보호구 권장 범위」 참고

2) 개인보호구는 사용원칙을 준수하고 올바른 방법으로 사용한다(착·탈의)(붙임 2 참조).

3) Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings, WHO, 2009

4) Stability of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) under different environmental conditions, Eurosurveillance Weekly, 19 September 2013

5) Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings, 2005 MMWR December 30, 2005 / Vol. 54 / No. RR-17

<표 1. 코로나바이러스감염증-19 대응 상황별 개인보호구 권장 범위>

상황, 행위	개인보호구						
	호흡기 보호			전신 보호			눈 보호
	수술용 마스크*	KF94 동급의 호흡기 보호구	전동식 호흡기 보호구	일회용 장갑 ⁶⁾	일회용 방수성 긴팔가운	전신보호복 (덧신포함)	고글 (또는 안면보호구)
검역(검역조사)		●		●			
검역(역학조사)		●		●		●	●
선별진료소 접수, 안내		●		●	●		
선별진료소 진료, 간호		●		●	●		●
이송(구급차 운전자) ⁷⁾		●		●			
이송(검역관 보건소직원 응급구조사 등)		●		●		●	●
구급차 소독		●		●	●		●
의심환자 병실출입, 진료, 간호 등		●		●	●		●
에어로졸 생성 처치 ⁸⁾		●		●	●		●
검사(X-ray 등 영상의학검사)		●		●	●		●
호흡기 검체 채취		●		●	●		●
검체 취급(실험실, 검사실 등) ⁹⁾¹⁰⁾		●		●	●		●
검체 이송(파손없이 포장된 검체)				●			
사체 이송, 안치		●		●	●		●
병실 청소·소독		●		●	●		●
의료폐기물 포장, 취급		●		●	●		●
의료폐기물 운반	●			●	●		

출처; 코로나바이러스감염증-19 대응지침(9-3판)(지자체용)(부록8)

* 식품의약품안전처고시 제2019-86호, 의약외품 범위 지정에 따른 수술용 마스크로 제한

6) 의심·확진 환자 구역의 진료, 처치, 간호, 검사, 청소 등을 시행할 경우 장갑 파손 위험, 감염 노출 위험을 고려하여 이중장갑 착용

7) 구급차 운전석이 차폐되어 있지 않거나 의심환자 또는 확진환자 접촉의 기회가 있을 경우 전신보호복(덧신포함), KF94 동급의 호흡기보호구, 장갑(필요 시 고글 또는 안면보호구 추가) 착용

8) 에어로졸이 생성되는 처치는 기관삽관(endotracheal intubation), 심폐소생술, 기관지내시경술, 기도분비물 흡인, 기관관리 (tracheostomy care), 사체부검, 비침습적 양압환기(Continuous positive air pressure), 분무요법 (nebulizer therapy), 가래배출 유도 등 처치, 상황, 행위를 말 함


9) 검체 취급 실험실·검사실에서 개인보호구 선택, 사용, 관리에 관한 사항은 실험실 생물안전지침(질병관리청 국립보건연구원 생물안전평가과)에 따름

10) ClassII급의 생물안전작업대 작업 시 가운(긴팔), 일회용 장갑 착용

Lee H, Ki C-S, Sung H, et al. Guidelines for the Laboratory Diagnosis of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus in Korea. Infection & chemotherapy. 2016;48(1):61-69.)

1 환자 접수단계

- ① 의료기관 내원
- ② 의료기관은 국민건강보험공단 홈페이지(www.nhis.or.kr) 수진자자격조회시스템 혹은 OCS를 통해 해외감염병 대상자 조회 접속
- ③ 내원환자의 주민번호 조회하여 대상자 여부 확인



※ 수진자자격조회시스템에 제공되는 문구

구 분	제공 문구
해외 방문 입국자	코로나19 해외 방문 입국자
확진자의 접촉자	코로나19 확진환자의 접촉자
확진 후 격리해제자	코로나19 확진 후 격리해제자

② 환자 진료, 처방·조제 단계

○ ITS(해외여행력 정보 제공 프로그램; International Traveler Information System)

- (접수단계) 접수 시 모든 환자의 해외여행력을 자동 점검 및 표출

* DUR 미이용 기관의 경우, 심평원에서 프로그램 설치 후 조회 가능

- (진료단계) 진료 시 접수된 환자 내역을 불러올 경우, 팝업창을 통해 해외여행력 정보제공

○ DUR(의약품 안전사용서비스; Drug Utilization Review) 시스템

- (약처방 단계) 약처방 시 DUR시스템을 통해 해외여행력 정보제공

※ ITS · DUR 시스템에 제공되는 문구

- **해외 방문 입국자 정보제공 (제공기간: 14일)**

[질병관리청 알림] 동 수신자는 해외 방문 입국자로 진료 시 참고하시고, 코로나바이러스감염증(COVID)-19 증상인 발열 또는 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 경우 1339 또는 관할 보건소로 신고 바랍니다.

※ 의료기관 주의사항: 1) 신고대상 환자는 전원/귀가 시키지 말고 독립된 공간에 대기
2) 신고대상 환자, 의료진 및 직원 마스크 착용

※ 개인정보 무단 유출 및 진료 거부에 활용되지 않도록 유의

- **확진환자의 접촉자 정보제공 (제공기간: 14일)**

[질병관리청 알림] 동 수신자는 코로나바이러스감염증-19 확진환자의 접촉자입니다. 발열, 기침, 호흡곤란 등 신종 코로나바이러스감염증 증상 부합시 ☎1339 또는 관할 보건소로 신고 바랍니다.

※ 의료기관 주의사항: 1) 의심환자 전원/귀가 시키지 말고 독립된 공간에 배치
2) 의심환자, 의료진 및 직원 마스크 착용

※ 개인정보 무단 유출 및 진료 거부에 활용되지 않도록 유의

□ **적용범위**

- 코로나바이러스감염증-19 의사환자, 확진환자 및 접촉자에 대한 대응 과정 전반
 - 검역, 이송, 역학조사, 선별진료, 진료, 처치, 검체채취 및 검체이송, 검사, 수술, 기구관리, 환경관리, 사체관리 등

□ **주요내용**

- 개인보호구의 종류, 선택, 착·탈의 및 주의사항, 의료폐기물로 배출



□ **사용원칙**

- 재사용이 불가피한 장비·제품을 제외하고 일회용 제품 사용을 원칙으로 함
- 재사용이 불가피한 장비는 반드시 제조사 권고에 따라 소독 또는 멸균 처리
- 표준주의, 접촉주의, 비말주의(또는 공기매개주의)를 포함한 감염관리 방법 준수
- 감염 예방에 효과적이려면 개인보호구의 선택과 올바른 사용이 중요함
 - 감염원과 접촉 전에 착용(예: 환자 접촉 전, 격리병실 밖)
 - 착용 할 때 보호구별 착용 방법 준수(특히, 호흡기보호구의 밀착 상태)
 - 사용한 개인보호구에 오염된 병원체가 주변을 오염시키지 않도록 주의
 - 착용 상태에서 환자 이외의 주변을 접촉하여 오염시키지 않도록 주의
 - 벗을 때 본인의 신체 부위와 주변을 오염시키지 않도록 주의
 - 사용한 개인보호구는 감염원으로부터 안전한 곳에서 제거(예: 격리병실 밖의 쉼의실 등)

- 사용한 개인보호구는 무조건 오염으로 간주하여 벗자마자 주변을 오염시키지 않도록 주의하여 의료폐기물상자에 버려 폐기되도록 함
- 모든 개인보호구는 일회용으로 사용하는 것을 원칙으로 함
- 파손되거나 오염된 개인보호구는 사용·보관하지 말고 폐기
- 사용한 개인보호구 중 재사용이 불가피하고 소독 처리가 가능한 장비에 한하여 적절한 소독 처리 후 사용
- 눈에 보이지 않게 손과 신체 일부, 의복이 오염될 수 있으므로 개인보호구를 벗은 후에 항상 손위생(손씻기 또는 손소독)과 개인위생 철저
- 개인보호구 충족 요건

보호대상	개인보호구*	필수여부	개인보호구 충족요건 또는 적용상황
호흡기	일회용 KF94 등급의 호흡기보호구	○	—
	PAPR(KF94 등급의 호흡기보호구 대체)	필요 시	에어로졸 발생되는 처치 시(KF94 등급의 호흡기 보호구 대체)
눈	고글(또는 안면보호구)	○	김서림방지 및 긁힘 방지 코팅 처리
전신 · 의복	일회용 전신보호복	○	방수성 또는 2-3시간 이상 방수 유지 혈액 및 바이러스 불침투 되는 제품
	일회용 장갑	○	손목까지 덮을 수 있는 장갑, 두 겹 착용
	일회용 덧신(신발덮개)	○	발목 높이의 미끄럽지 않은 재질
	일회용 덧가운/앞치마	필요 시	몸통에서 종아리까지 덮을 수 있는 보호구 예) 투석이나 지속적 신대체요법 시 착용

□ 개인보호구의 종류와 용도, 상황별 권장범위

- 개인보호구는 호흡기, 눈, 손, 발을 포함한 전신과 의복을 감염원으로부터 보호하도록 고려하여 선택
 - 일회용 방수성 긴팔가운, 일회용 장갑, 마스크(N95 또는 KF94 이상), 고글 또는 안면보호구, 장화 또는 신발커버 등
- 개인보호구는 질환별 또는 감염경로, 감염 노출 상황·행위, 용도에 맞게 보호구를 선택하여 사용하는 것이 중요

○ 개인보호구별 특성과 용도

보호구	위해요소	특성 및 용도(indications for use)	참고사진
일회용 장갑(Glove)	접촉	<ul style="list-style-type: none"> • 손 오염 방지 • 노출정도를 고려하여 재질 선택 • 파우더 알러지 있을 경우 파우더 없는 제품 또는 나이트릴 제품 사용 	
일회용 방수성 긴팔가운(Gown)	비말, 혈액, 체액이 전신이나 의복에 튼	<ul style="list-style-type: none"> • 바이러스 비말이 전신과 의복에 • 오염되어 간접 전파 되는 것을 방지 	
전신보호복 ¹¹⁾ (Coveralls)	비말, 혈액, 체액이 전신이나 의복에 튼	<ul style="list-style-type: none"> • 바이러스 비말이 전신과 의복에 오염되어 간접 전파 되는 것을 방지 	
덧신 (Shoe covers)			
장화 (Boots)	혈액, 체액이 신발에 튼	<ul style="list-style-type: none"> • 신발덮개 대신 착용 • 바닥이 젖거나 오염이 심할 경우 • 노출위험에 따라 선택 	
헤어캡 (Hair cap)	머리의 오염	<ul style="list-style-type: none"> • 비말이 머리에 오염되는 것을 방지 	
보안경 (Goggle)	혈액, 체액이 눈의 점막에 튼	<ul style="list-style-type: none"> • 눈의 점막 오염 방지 • 보안경 채용 시 바이러스에 효과적인 • 소독제로 소독 후 사용, 보관 	
안면보호구 (Face shield)	혈액, 체액이 눈의 점막에 튼	<ul style="list-style-type: none"> • 눈의 점막과 안면부 오염 방지 • 노출 위험 정도에 따라 보안경 대신 착용 • 안면보호구 재사용 시 바이러스에 효과적인 소독제로 소독 처리 후 사용, 보관 	
호흡기보호구 ¹²⁾ : KF94 등급 이상의 호흡기보호구	비말 또는 에어로졸 흡입	<ul style="list-style-type: none"> • 코, 입 점막을 통해 호흡 시 병원체 입자가 유입되는 것을 방지. • 적용상황 예 : <ul style="list-style-type: none"> - 의심/확진 환자 격리병실 입실 시(의료 종사자, 방문객 포함한 모든 출입자) - 기침유도 시술 시 - 에어로졸 생성 처치 시 - 의심/확진환자 이송 시 등 	
호흡기보호구 : PAPR ¹³⁾	비말 또는 에어로졸 흡입	<ul style="list-style-type: none"> • 코와 입의 점막을 통한 감염원 흡입 방지 • 전지충전, 필터교환, 장비 소독 등 철저한 점검, 관리가 필요함 • 파손, 오작동 여부를 사전 점검하여 사전 수리, 교체 또는 폐기하여야 함 • 재사용이 불가피하면 소독 처리 후 사용, 보관 	

□ 개인보호구 착의(착용) 및 제거

○ 착의(착용)

- 상황에 따른 개인보호구 권장 범위에 따라 미리 물품을 준비하여 올바른 착용* 순서와 방법으로 착용

- * 머리는 단정히 묶거나 고정하고 시계, 장신구 등을 제거하여 오염 방지
- * 탈수 예방을 위해 보호구 착용 전 수분을 보충하고 미리 화장실에 다녀옴
- * 착용 후 오염, 파손이 있을 경우 처치, 행위 사이에 개인보호구 교체
- * 속장갑이 젖을 정도라면 근무자 교대

○ 탈의(제거)

- 감염원으로부터 안전한 곳(예: 격리병실 밖의 쉼실 등)에서 개인보호구에 오염된 감염원이 신체 부위와 주변을 오염시키지 않도록 주의하며 탈의
- 각 보호구는 벗자마자 주변을 오염시키지 않도록 주의하며 올바른 순서와 방법으로 탈의하여 의료폐기물상자에 바로 버림

구분	KF94 동급의 호흡기보호구와 전신보호복 사용 시 순서		PAPR과 전신보호복 사용 시 순서
착의 (착용) 순서	1	손위생	손위생
	2	(속)장갑	(속)장갑
	3	전신보호복 하부	전신보호복
	4	신발커버(또는 장화)	신발커버(또는 장화)
	5	KF94 동급의 호흡기보호구	전동식호흡기보호구(PAPR) ¹⁴⁾
	6	보안경(또는 안면보호구)	후두
	7	전신보호복 상체후드 착용 및 여밈	전동식호흡기보호구와 후두 연결
	8	(겉)장갑	(겉)장갑
(격리실 등 전염력이 있는 구역 밖에서 탈의)			
탈의 ¹⁵⁾ (제거) 순서	1	(겉)장갑	(겉)장갑
	2	장갑 소독	장갑 소독
	3	전신보호복	전동식호흡기보호구(PAPR)
	4	신발커버(또는 장화)	후드
	5	장갑소독	전신보호복
	6	보안경(또는 안면보호구)	신발커버(또는 장화)
	7	KF94 동급의 호흡기보호구	(속)장갑
	8	(속)장갑	손위생
	9	손위생	-

11) 감염성 물질에 대한 보호력이 있는 보호복을 선택. 예를 들면, 유럽의 경우 EN14126, ASTM1671 규정을 따르며, 생물학적 위험(biohazard) 표시가 있는 보호복을 사용

12) 호흡기보호구(Respirator) : 숨 쉴 때 병원성 입자를 흡입하지 않도록 착용하는 보호구

13) PAPR : 전동식 공기정화 호흡기보호구(Powered air-purifying respirator)

14) PAPR과 후두 착·탈의 순서는 제품에 따라 상이할 수 있으므로 제조사 권고에 따름

15) 보호구 벗는 과정에서 속장갑이 오염될 수 있으므로 하나씩 제거할 때마다 손소독 후 다음 보호구를 탈의(제거)하는 것이 유용함

<개인보호구 Level D 착·탈의법(예시)>

Level D

개인보호구 착의법

질병관리본부 공중보건위기대응사업단
국가지정격리병상 교육훈련 지원센터
www.phcret.or.kr



개인보호구 착의 준비



속장갑 착용



보호복 점검



지퍼덮개 확인



지퍼를 끝까지 올린다



엄지고리 끼우기



신발끈 매듭 묶기



N95 마스크 착용준비



N95 마스크 착용



N95 마스크 밀착 확인



고글 착용



보호복 후드 착용



보호복 착의 점검



겉장갑 착용



보호복 착의 상태 확인

Level D **개인보호구 탈의법**



□ 선별진료소 냉방기(에어컨) 설치 및 사용

○ 건물형 선별진료소

- 해당 건물의 공조시스템에 의해 전배기, 전외기 급기로 선별진료소의 환기가 이루어지는 경우 냉방은 공조시스템의 냉방기를 가동함
(별도의 개별 냉방기 사용을 지양함)

○ 콘테이너, 텐트 등 임시 선별진료소

- 감염 예방을 위해 가급적 고효율필터(헤파필터) 냉방기 설치를 권장
- 다만, 고효율필터(헤파필터) 냉방기 사용이 어려운 경우에는 비말의 기본적인 입자 크기($2.5\mu\text{m}$)를 감안하여 냉방기 여과수준이 PM 2.5($2.5\mu\text{m}$ 이하의 입자) 99.9% 이상인 일반 냉방기¹⁸⁾ 설치·사용 가능
- 냉방기 설치 위치 및 관리 기준 등을 반드시 준수할 것


※ 선풍기(냉풍기 포함)는 비말을 인위적으로 확산시킬 우려가 있어 의료진 등 근무자의 휴게공간 등에서 제한적으로 사용

* 냉풍기는 내부 고습으로 인해 진균 및 세균 오염이 가능하므로 사용하는 경우 철저한 관리 필요

○ 냉방기 설치 위치 및 운행 관리

- 의료진(의사, 검체 채취자 등)에서 **환자방향으로 일방향 송풍**
- 실내에서 와류가 형성되지 않도록 공기흐름이 일정하게 관리
: 냉방기/출입구 문 → 음압기/창문 방향(그림 참조)

18) 일반적인 시판 냉방기의 여과수준은 PM 2.5($2.5\mu\text{m}$ 이하의 입자)를 99.9% 제거하며 비말(에어로졸) 입자 또한 이에 속함



<진료실(검사실) 내 냉방기 송풍방향>

- 송풍 방향은 최대한 위쪽으로 조정(바람이 비말에 닿는 것을 최소화)
- 냉방기 풍량은 중간 이하, 목표 온도 낮게 설정, 송풍 대신 냉방으로 설정 (자동모드 금지)

□ 냉방기 관리 및 환기

- (필터 교환) 기본적으로 해당 제품의 교환주기에 따르나 최소한 6개월을 초과하지 않을 것을 권장
- (표면 소독) 일반적으로 권장하는 소독제로 소독하며, 비말이 발생한 경우 환자 퇴실 즉시 냉방기 표면(특히 공기흡입구)을 소독

※선별진료소 운영안내 p11 <(3)선별진료소 환경 소독 실시> 참고

- (실내 환기)
 - (음압설비) 음압 설비된 경우 별도 자연환기는 요구되지 않음
 - (비음압, 자연환기) 원칙적으로 창문을 닫을 수 없으므로 창문을 열어 환기를 유지한 상태로 냉방기 가동, 환자가 없는 시간에 창문을 닫아 냉방온도 유지

□ 선별진료소 구역별 냉방기 관리

○ 접수·진료실

- 의료진 및 환자 모두 마스크 착용(비말 배출 방지)
- 음압이 아닌 경우 주기적 (자연)환기 필요
- 환경표면 소독 자주 시행

○ 검체 채취실




- 의료진은 마스크 착용 철저
- 환자 간 충분한 환기 및 환경표면 소독 자주 실시
- 음압이 아닌 자연 환기인 경우 가급적 실외*에서 검체 채취 고려
- * 환기가 잘되는 넓은 공간으로 주변에 사람의 이동이 통제되는 장소

□ 개인보호구의 선택

○ 선별진료소 진료 및 검체 채취 시 긴팔가운을 포함한 4종(KF94 동급의 호흡기 보호구, 장갑, 방수성 긴팔가운, 고글 또는 안면보호구) 사용 권장

- 특히 냉방여건이 충분하지 않은 경우 전신보호복으로 인한 온열질환 발생 위험이 있으므로 가급적 긴팔가운을 포함한 4종 보호구를 착용

* 긴팔가운 4종 세트(①)와 전신보호복(레벨D, ②) 선택 사용 가능(붙임1)

접수·안내 (비닐가운 또는 긴팔가운)	진료, 검체 채취		
	① 긴팔가운 4종 세트(모자는 선택)		② 전신보호복(레벨 D)
		또는	

참고 1

격리 공간 설치 예시

참고 : 메르스(MERS) 감염병관리기관 실무대응지침(국립중앙의료원, 2015)

- ① 격리공간은 1인실을 원칙으로 하며 격리 공간 내에 화장실을 갖추도록 한다.
- ② 한 격리공간에 여러 환자를 격리하고자 한다면 의심환자(suspect case)와 그렇지 않은 환자를 분리한다.
- ③ 음압시설이 이루어져 있지 않다면 환기가 잘 되도록 하며 일반인들에게 노출되지 않도록 근처 접근을 통제한다.
- ④ 격리공간 내의 화장실은 이동식 변기 등을 설치하여 이용하며, 대기 공간과 화장실을 분리한다.




그림 1. 선별진료소 설치 예시(별도 공간 설치)

※ 진료실 내부




그림 2. 선별진료소 내부 예시(원내 공간 설치)

※ 음압텐트 설치 예



※ 일반텐트 설치 예




그림 3. 음압텐트 및 일반텐트 설치

참고 2

코로나바이러스감염증-19 유전자(PCR)검사 안내

(출처;코로나바이러스감염증-19 대응지침(제9-3판)(지자체용)(Ⅷ. 실험실 검사 관리)

1. 검체 채취

가. 채취장소

- (채취 장소) 선별진료소 또는 의료기관 내 다른 공간과 격리된 검체 채취 공간

* 단, 자가격리일 경우 격리장소에 따라 채취장소 변동 가능성 있음

나. 검체종류 및 포장

- (검체종류) 상기도(구·비인두 도말 혼합) 검체, 기침이나 가래가 있는 경우 하기도 검체

- 경증인 자 : 상기도 검체만 채취하여 검사 의뢰

번호	검체 종류	용기 및 용량	비고
1	상기도 ·구인두도말물 ·비인두도말물	·(용기) 하나의 VTM 배지에 비인두와 구인두도말물 동시 채취	· 분리된 독립공간에서 채취
2	하기도 ·가래	·(용기) 멸균 50ml 튜브 ·(검체량) 3ml 이상	· 가래가 있는 환자에서 채취 · 가래 유도 금지(에어로졸 발생 가능성 있음) · 정확한 진단을 위해 가래 채취가 반드시 필요한 경우 음압실에서 채취 (음압 시설이 없는 경우, 에어로졸 발생 가능성이 있으므로, 외부 환기가 잘 되는 독립된 공간에서 채취)

* (필수 검체) 상기도, (선택 검체) 하기도

- (상기도 검체) 상기도 검체는 비인두도말물과 구인두도말물을 각각 채취하여 하나의 바이러스용 수송배지에 담아 검체시험의뢰서(서식 18)와 함께 수송
 - 비인두도말물(Nasopharyngeal swab) : 콧구멍을 지나 입천장과 평행한 각도로 면봉을 밀어넣고 하비갑개 중하부에서 분비물을 긁어서 채취, 하비갑개 중하부에서 몇 초간 분비물을 흡수할 수 있는 시간을 두도록 하여 채취
 - 구인두도말물(Oropharyngeal swab) : 혀를 누르고 인두후벽에서 분비물을 긁어서 채취

<구인두도말물 채취 방법>



출처: ADAM, 인플루엔자, 신종인플루엔자 범 부처 사업단(TEPIK)


<비인두도말물 채취 방법>



<상기도 채취 방법>

●검체 용기 보관 방법

- 수송배지가 담긴 병에 도말한 면봉을 담고 병마개 부위에서 면봉을 부러뜨린 후 뚜껑을 단단히 잠그도록 함
- 부러뜨릴 때 안쪽에 손이 닿아 오염되지 않게 주의
- 검체가 담긴 병은 즉시 냉장고(4℃)에 보관
- 검체채취 후 반드시 채취용기에 환자의 인적사항(성명, 성별, 연령) 및 채취일을 기입
- 검사의뢰서를 작성하여 검체와 함께 의뢰(4℃ 유지)



- (하기도 검체) 환자 스스로 구강 내를 깨끗한 물로 세척한 후, 멸균용기(가래통 등)에 타액 등이 포함되지 않도록 깊이 기침하여 채취

* 검체가 오염되지 않도록 주의하고 수송 시 누출되지 않도록 완전히 밀봉(3중 포장)



1. 구강 세척



2. 무균용기 사용



3. 기침하여 가래 채취






4. 완전 밀봉
(4℃ 유지)

<가래 채취 방법>

○ 검체포장

- 채취된 검체가 포함된 1차 용기를 소독처리(70% ethanol)한 후 라벨 작성
- * 병원명, 검체종류, 채취일, 환자명, 성별, 나이 등의 정보 표시
- 소독 처리된 1차 용기를 흡수제(종이타올 등)로 감싼 후 2차 용기에 넣음
- 2차 용기의 뚜껑을 단단히 잠근 후 3차 용기에 넣음
- 검체 시험의뢰서를 3차 용기 뚜껑 사이에 넣은 후 포장
- 3차 수송용기 겉면에 보내는 사람, 받는 사람, 응급상황 시 연락처를 기재
- 3차 수송용기를 아이스박스에 넣은 후 냉매제(아이스팩)를 용기 주변 4면에 삽입

- 포장된 아이스박스의 겉면에 감염성 물질 표식, UN 3373 표식, 방향 표식, 보내는 사람, 받는 사람, 응급상황 시 연락처 등을 기재

구 분	1차 용기	2차 용기	3차 용기
포장용기			

<3중 포장용기 예시>

다. 주의 사항

- (주의 사항) 검체 채취 시, KF94 또는 동급의 호흡기보호구, 일회용 장갑, 일회용 긴팔가운 또는 전신보호복, 고글 또는 안면보호구(필요시 불투과성 일회용 앞치마 추가 착용) 등의 개인보호구를 필수적으로 착용 및 검체 채취 후 소독 필수
- ☞ [붙임 2] 코로나바이러스감염증-19 관련 개인보호구의 사용 참조

2. 검사 의뢰

- (의뢰방법) 검체시험의뢰서를 작성하여 검체와 함께 의뢰
 - ※ 검사 의뢰시 검사대상이 ‘최초 의뢰(신규)’ 또는 ‘기 확진자’ 인지 검체시험의뢰서(의사 소견란)에 추가로 명확히 기재하여 의뢰
- ☞ [서식 1] 검체시험의뢰서 서식
- 기관별 검사의뢰
 - (의료기관 선별진료소) 검사가 가능한 기관은 자체적으로 검사하고, 검사가 불가능한 기관은 수탁검사기관으로 검사 의뢰
 - (보건소 선별진료소) 수탁검사기관으로 검사 의뢰
 - * 수탁검사기관 검사가 불가능한 경우 보건환경연구원으로 검사의뢰 가능
 - (검역소) 검체채취 후 권역별 질병대응센터(진단분석과 실험실) 소관 실험실로 검사 의뢰

3. 검체 운송

가. 검체운송 담당

- (민간 의료기관 검사할 경우) 자체 검사 가능한 경우 운송 불필요, 수탁검사기관으로

운송은 해당 검사기관 운송체계에 따라 운송

- (보건환경연구원 검사할 경우) 환자 최초인지 보건소 담당자가 관할 보건환경연구원으로 이송

* 검체 운송 담당자는 KF94 등급의 호흡기보호구, 장갑 착용하고, 검체의 종류, 채취시간, 이송시간 정보를 확인하여 질병관리청 보건환경연구원으로 상황보고

- (권역별 질병대응센터 검사할 경우) 검역소에서 질병대응센터(진단분석과 실험실)로 이송

나. 검체 운송 중 보관 조건

- 바이러스 분리 및 유전자 검사용 검체 : 4℃를 유지하여 즉시 수송

* 72시간 내 운송 불가능한 경우 -80℃에 보관 후 드라이아이스를 이용해 수송

다. 검체 운송 시 유의사항

- 검체 수송 담당 지정

- 감염성물질안전수송지침(질병관리청) 준수

- (수송 차량 선정 및 비치) 포장된 검체를 자가운전 차량(또는 지정차량) 트렁크에 비치하여 흔들리지 않도록 고정하고, 수송차량 내부에는 만일의 사태에 대비한 적절한 개인보호구와 오염처리 장비(스필 키트), 소독제, 삼각대 등을 준비

- (이동 경로 선정 및 주의사항) 최단거리 및 안전한 경로를 지정하여 기관 책임자에게 보고 후 출발하고, 미리 정해진 이동 경로로만 이동(휴게소 이용 시 정지된 차량에 필수인원 잔류)하고 이동 중 방어 운전과 도로교통 신호 및 규칙 준수

4. 검사 기관

※ 기관에서 실시한 확진 검사에서 최초 양성을 확인한 경우, 질병관리청과 2중 확인 필요 (최초 양성 1회에 한하며, 이후에는 검사기관 자체 양성 판정 가능)

가. (의료기관*) 의사환자 등 대상 유전자 검사, 격리해제를 위한 유전자 검사

* 자체적으로 검사 가능한 의료기관 및 검사전문 의료기관(수탁검사기관)

- (확진검사) 질병관리청장이 지정한 코로나19 검사 가능 의료기관

☞ [부록 1] 코로나19 검사가능 기관

- (응급선별검사) 응급의료기관 및 질병관리청장이 지정한 코로나19 검사 가능 의료기관

* 신속한 음성 확인을 위한 선별 목적의 검사로 검사 위탁 불가

① 핵산추출 및 유전자증폭을 위한 시약 혼합 등의 과정이 필요한 검사법의 경우, 응급의료기관 중 질병관리청장이 지정한 코로나19 검사 가능 의료기관에서 검사 시행

② 핵산추출 및 유전자증폭을 위한 시약 혼합 등의 과정이 생략된 검사법의 경우,

진단검사전문자가 상주하는 응급의료기관에서 검사 시행

* 응급의료기관은 건강보험심사평가원 홈페이지에서 확인 가능(병원·약국 찾기>세부조건별 찾기>응급의료기관)

【응급선별검사 적용 대상】

• 코로나19 관련 의심증상이 없는 응급실* 내원환자로서

① 중증응급환자(중증도 등급기준 1 등급 및 2 등급)** 또는

② 6시간 이상 지연할 수 없는 응급수술이 필요한 중증응급의심환자(중증도 등급기준 3 등급)**

* 응급의료에 관한 법률」에 따라 지정된 응급의료기관의 응급실

** 「응급의료에 관한 법률 시행규칙」 제18조의3(응급환자의 중증도 분류)에 따른 「한국 응급환자 중증도 분류기준」 고시(제 2015-243호)

※ 코로나19 사례정의에 부합하는 응급환자의 경우 확진검사 시행(응급선별검사 대상 아님)

나. (보건환경연구원) 환자(의사환자)가 아닌 경우로 감염원 원인규명을 위하여 역학조사 과정 중 제한적으로 검사가 필요한 경우, 민간의료기관에서 검사가 불가능한 경우(야간 응급환자 발생)에 한하여 확진 검사

* 환자 최초 인지 보건소에서 검체 채취 및 관할 보건환경연구원으로 검사의뢰

다. (질병대응센터) 검역조사 과정의 유증상자 대상 유전자 검사

* 항만입국자의 경우 무증상자도 검사 시행

라. (국군의학연구소) 군인 및 군 관계자 대상 유전자 검사

5. 검사 결과 보고

가. (의료기관) 검사기관에서는 의사환자 등의 검사를 의뢰한 기관(보건소 또는 의료기관)으로 결과 통보 및 제출

- 보건소 및 의료기관은 검사기관으로부터 받은 결과를 「질병보건통합관리시스템」 - 환자 감시 메뉴에 입력·보고

- 검사결과는 의료기관 담당 의료진을 통해 환자에게 통보 및 설명

※ 단, 양성인 경우 질병관리청 종합상황실(043-719-7789, 7790)과 검사의뢰 보건소로 즉시 유선 통보

【의료기관의 응급선별검사 결과 처리 방법】

- (양성인 경우) 의심환자(조사대상 유증상자 1-의사소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자)로 신고 및 확진검사(기존 유전자검사) 실시
 - * 코로나19 확진검사가 자체적으로 불가능한 경우, 검사전문 의료기관에 의뢰하여 실시
- ☞ [부록 10] 코로나19 검사가능 기관
- * 검사결과 양성 건은 반드시 즉시 입력해야하며, 당일 보고 건에 한하여 질병관리청 (종합상황실)에서 확진환자번호 부여
- (음성인 경우) 신고 불필요, 검사결과 환자에게 통보 및 설명

나. (보건환경연구원) 검사결과는 「질병보건통합관리시스템」에 결과 입력·보고

※ 단, 양성의 경우 질병관리청 종합상황실과 최초 인지 보건소로 즉시 유선 통보

☞ [부록 1] 코로나19 검사가능 기관

다. (질병대응센터) 검사를 의뢰한 검역소로 결과 통보

라. 주의 사항

- 재검 필요 시, ‘코로나바이러스감염증-19 검사실 진단지침’과 ‘COVID-19 검사 Q&A’ 최신판을 참고하여 종합적으로 판정
(해당 지침은 ‘대한진단검사의학회 홈페이지’에서 확인 가능)
- 검사결과에 따른 격리해제 조치결정이 어려운 경우(예: 24시간 이상 간격으로 검사하여 미결정이 연속 3회 이상 반복되는 상황 등)는 중앙방역대책본부와 협의할 수 있음

【중앙방역대책본부와 협의 요청 방법】

- 다음 각 호의 자료를 첨부하여 중앙방역대책본부 격리자관리팀에 문서로써 협의 요청
 - 대상자 인적정보
 - 역학정보(접촉관계, 노출이력 등)
 - 임상정보(검사결과기록, 검사기관 등)

서식 1

검체 시험의뢰서 서식

※ 해당 서식은 질병관리청으로 의뢰하는 경우에 대한 서식으로, 관할 보건환경연구원이나 다른 검사기관으로 검사 의뢰시, 해당기관의 서식에 맞추어 작성 및 의뢰 필요

■ 질병관리청 시험의뢰규칙 [별지 제7호서식] <개정 2019. 8. 23.>

() 검체 시험의뢰서				처리기간	
				「질병관리청 시험검사 등에 관한 고시」에 따른 처리기간을 참고하시기 바랍니다.	
의뢰기관	의료기관명		담당자 성명		
			담당자 연락처		
	주 소	(전화번호:) (팩스번호:)			
환자	성 명 (또는 관리번호)		생년월일		성 별
	발병일		검체채취일		
검체 종류(수량)					
시험항목					
검체 채취 구분 (1차 또는 2차)					
담당의사소견서					
담당의사 : (서명 또는 인)					
「질병관리청 시험의뢰규칙」 제4조에 따라 위와 같이 시험을 의뢰합니다. 년 월 일 의뢰기관의 장 [인] 질병관리청장 귀하					
※ 첨부자료 1. 검사대상물 2. 그 밖에 시험에 필요한 자료					
유의사항					
1. 의뢰인은 「의료법」에 따른 의료기관이어야 하며, 의료기관장의 직인을 날인합니다. 2. 의뢰기관의 전화번호는 결과회신이 가능한 번호로 기재하여 주시기 바랍니다. 3. 후천성면역결핍증(AIDS)의 경우, 환자의 성명 대신 관리번호를 기재하여 주시기 바랍니다. 4. 검체 종류(수량)란에는 검체의 종류와 종류별 수량을 함께 기재하여 주시기 바랍니다. [예: 혈액(2개)]					
처리 절차					
의뢰서 작성	➔	접수	➔	시험·검사	➔
				결재	➔
				성적서 발급	
의뢰인		질병관리청(담당부서)			

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

서식 2

코로나 19 검사의뢰서 (선별진료소 제출용)¹⁹⁾

(앞면)

의뢰기관	의료기관명			담당자	성명		
	주소				휴대전화		
환자	성명 (또는 관리번호)			생년월일		성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
	연락처	전화			휴대전화		
위험요인		<input type="checkbox"/> 코로나19 의심증상을 가진 가족 또는 지인 접촉 <input type="checkbox"/> 직업상 불특정 다수 접촉 <input type="checkbox"/> 기 확진자 또는 집단발생과의 연관 의심 <input type="checkbox"/> 기타()					
증상		<input type="checkbox"/> 발열 (_____℃) <input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 가래 <input type="checkbox"/> 인후통 <input type="checkbox"/> 호흡곤란 <input type="checkbox"/> 근육통 <input type="checkbox"/> 두통 <input type="checkbox"/> 오한 <input type="checkbox"/> 후각 소실 <input type="checkbox"/> 미각 소실 <input type="checkbox"/> 기타증상()					
검사항목		<input type="checkbox"/> 코로나19 <input type="checkbox"/> 동시검사(코로나19+인플루엔자)					
담당의사 소견서 <div style="text-align: right;">담당의사 : (서명 또는 인)</div>							
위와 같이 코로나 19 등 진단검사를 의뢰합니다. <div style="text-align: center;"> 년 월 일 의뢰기관의 장 [인] </div>							
선별진료소장 귀하							
유의사항							
1. 의뢰인은 「의료법」에 따른 의료기관이어야 합니다. 2. 환자 연락처는 검사 결과 회신이 가능한 번호이어야 합니다.							
처리 절차							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">의뢰서 작성</div> <div>➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">환자 전달</div> <div>➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">선별진료소 방문</div> <div>➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">검사 실시</div> <div>➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">결과 통보</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 의료기관 환자 선별진료소 </div>							

19) '코로나19-인플루엔자 동시유행 대비 일반 의료기관 진료절차 안내'('20.11, 중앙방역대책본부)

서식 3

검사 결과 제공 동의서 (선택)

(뒷면)

☐ 신청인 기본 정보

성명		성별	<input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여	생년월일	
----	--	----	---	------	--

☐ 개인정보 수집·이용·제공 동의

개인정보 수집 및 이용 안내	
수집하는 개인정보의 항목	의료법 시행규칙 제14조(진료기록부 등의 기재사항), 성명, 생년월일, 성별, 코로나19 또는 인플루엔자 진단검사 결과
개인정보의 수집 및 이용 목적	코로나19 또는 인플루엔자 진단검사 결과를 검사 의뢰한 의료기관에 통보
개인정보의 수집 및 이용기간	의료법 시행규칙 제 15조(진료기록부 등의 보존)에 명시된 기간에 준하여 보유하며, 연속적인 의료서비스 제공을 위해 더 연장할 수 있습니다.

본인은 「개인정보보호법」에 의거하여 위 사항에 대해 충분히 인지하였으며, 성명, 생년월일, 성별, 코로나19 또는 인플루엔자 진단검사 결과를 검사 의뢰한 의료기관에 제공하는 데에 동의합니다.

성명 : (서명)

년 월 일

※ 동의하지 않아도 검사를 받을 수 있으며, 검사결과는 본인에게만 통보됩니다.

부록 1

코로나19 검사 가능 기관 (2020. 8. 10. 기준, 총 113개소)

※ 질병관리청 홈페이지(www.cdc.go.kr) - 알림·자료 - 공고/공시에서 변동정보 참고

[수탁검사기관 : 17개소]

	지역	기관명	주소	대표연락처
1	서울 (5)	(의)삼광의료재단	서울특별시 서초구 바우피로41길57	02-3497-5100
2		씨젠의료재단 씨젠의원	서울특별시 성동구 천호대로320	1566-6500
3		의료법인장원의료재단 유투의원	서울특별시 송파구 거마로 68 장원빌딩	02-910-2100
4		한국필의료재단	서울특별시 강동구 성내로 71	02-517-1728
5		BGK진단검사의학과의원	서울특별시 성동구 성수2로 89 MG 빌딩 9층	070-4755-9780
6	부산 (2)	씨젠부산의원	부산광역시 동구 중앙대로 297	1566-6500
7		삼광의료재단 부산센터	부산광역시 부산진구 전포대로 178 케이제이 빌딩 7층	1661-5117
8	인천 (1)	의료법인 이원의료재단	인천광역시 연수구 하모니로291 (송도동 13-49)	1600-0021
9	대구 (1)	씨젠의료재단 대구경북검사센터	대구 수성구 달구벌대로 2619	1566-6500
10	경기 (6)	(재)서울의과학연구소(SCL)	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 A동	1800-0119
11		녹십자의료재단	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107	1566-0131
12		랩지노믹스 진단검사의학과	경기도 성남시 분당구 판교로375	031-628-0700
13		선함의원(에스큐랩, SQLab)	경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 53-21 (중동) 선함빌딩	031-283-9270
14		의료법인 신원의료재단	경기도 광명시 소하로109번길 13-8	1899-1510
15		티씨엠랩의원	경기도 성남시 분당구 쇄골로 7 초이스빌딩 2층, 3층	031-698-2728
16	충북 (2)	한국건강관리협회 중앙검사의원	충청북도 청주시 상당구 단재로 393	043-292-1107
17		결핵연구원	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-5	043-249-4950


[의료기관 : 96개소]

	지역	기관명	주소	대표연락처
1	서울 (32)	가톨릭대학교 서울성모병원	서울특별시 서초구 반포대로222	1588-1511
2		가톨릭의대 은평성모병원	서울특별시 은평구 통일로1021	1811-7755
3		강동경희대학교병원	서울특별시 강동구 동남로892	1577-5800
4		강북삼성병원	서울특별시 종로구 새문안로29	1599-8114
5		고려대학교 구로병원	서울특별시 구로구 구로동로148	02-2626-1114
6		고려대학교 안암병원	서울특별시 성북구 고려대로73	1577-0083
7		국립중앙의료원	서울특별시 중구 을지로245	02-2260-7114
8		삼성서울병원	서울특별시 강남구 일원로 81	02-3410-2114
9		서울대학교병원	서울특별시 종로구 대학로 101	1588-5700
10		서울아산병원	서울특별시 송파구 올림픽로43길88	1688-7575
11		서울특별시 보라매병원	서울특별시 동작구 보라매로5길20	02-870-2114
12		서울특별시 서울의료원	서울특별시 중랑구 신내로156	02-2276-7000
13		순천향대학교 부속 서울병원	서울특별시 용산구 대사관로59	02-709-9114
14		연세의대 강남세브란스병원	서울특별시 강남구 언주로211	1599-6114
15		연세의대 세브란스병원	서울특별시 서대문구 연세로50-1	1599-1004

	지역	기관명	주소	대표연락처
16	경기 (20)	이화의대부속 목동병원	서울특별시 양천구 안양천로1071	1666-5000
17		인제대학교 상계백병원	서울특별시 노원구 동일로1342	02-950-1114
18		한림대부속 강남성심병원	서울특별시 영등포구 신길로1	02-829-5114
19		H+양지병원	서울특별시 관악구 남부순환로 1636	1877-8875
20		경희의료원(경희대학교병원)	서울특별시 동대문구 경희대로23	02-958-8114
21		중앙대학교병원	서울특별시 동작구 흑석로102	1800-1114
22		한림대학교 강동성심병원	서울특별시 강동구 성내길150	1588-4100
23		한양대학교병원	서울특별시 성동구 왕십리로 222-1	02-2290-8114
24		한전의료재단 한일병원	서울특별시 도봉구 우이천로308(쌍문동)	02-901-3114
25		가톨릭대 여의도성모병원	서울특별시 영등포구 63로 10	1661-7575
26		중앙보훈병원	서울특별시 강동구 진황도로61길 53	1800-3100
27		노원을지대학교병원	서울특별시 노원구 한글비석로 68	1899-0001
28		한국원자력의학원 원자력병원	서울특별시 노원구 노원로 75	02-970-2114
29		이화여자대학교 의과대학 부속 서울병원	서울특별시 강서구 공항대로 260	1522-7000
30		건국대학교병원	서울특별시 광진구 능동로 120-1	02-1588-1533
31		성광의료재단 강남차병원	서울특별시 강남구 논현로 566	02-3468-3000
32		서울서북병원	서울특별시 은평구 갈현로7길 49	02-3156-3000
33		가톨릭의대의정부성모병원	경기도 의정부시 천보로271	1661-7500
34		고려대학교 부속안산병원	경기도 안산시 단원구 적금로123	1577-7516
35		국민건강보험공단 일산병원	경기도 고양시 일산동구 일산로100	1577-0013
36		명지병원	경기도 고양시 덕양구 화수로 14번길 55(화정동)	031-810-5114
37		분당서울대학교병원	경기도 성남시 분당구 구미로173번길 82	1588-3369
38		분당차병원	경기도 성남시 분당구 야탑로59	1577-4488
39		순천향대학교 부속부천병원	경기도 부천시 조마루로170	1899-5700
40		한림대학교 동탄성심병원	경기도 화성시 큰재봉길7	1522-2500
41		동국대학교 일산(불교)병원	경기도 고양시 일산동구 동국로 27	1577-7000
42		가톨릭대학교성빈센트병원	경기도 수원시 팔달구 중부대로 93	1577-8588
43		아주대학교병원	경기도 수원시 영통구 월드컵로 164	1688-6114
44		한림대학교 (평촌)성심병원	경기도 안양시 동안구 관평로 170번길 22	031-380-1500
45		한양대학교구리병원	경기도 구리시 경춘로 153	1644-9118
46		국군수도병원	경기도 성남시 분당구 새마을로177번길 81	1688-9151
47		가톨릭대학교 부천성모병원	경기도 부천시 소사로 327	1577-0675
48		분당제생병원	경기도 성남시 분당구 서현로180번길 20	031-779-0114
49		인제대학교 일산백병원	경기도 고양시 일산서 주화로 170	031-910-7114
50		국립암센터	경기도 고양시 일산동구 일산로 323	031-920-0114
51		원광대산본병원	경기도 군포시 산본로 321	031-390-2300
52		동수원병원	경기도 수원시 팔달구 중부대로 165	031-210-0114
53	부산 (6)	부산대학교병원	부산광역시 서구 구덕로179	051-240-7000
54		인제대학교 부산백병원	부산광역시부산진구 복지로 75	051-890-6114
55		동아대학교병원	부산광역시 서구 대신공원로 26	051-240-2000
56		좋은강안병원	부산광역시 수영구 수영로 493 (남천동)	051-625-0900
57		인제대학교 해운대백병원	부산광역시 해운대구 해운대로 875	051-797-0100
58		고신대학교 복음병원	부산광역시 서구 감천로 262	051-990-6114
59	대구	경북대학교병원	대구광역시 중구 동덕로 130	1666-0114

	지역	기관명	주소	대표연락처
60	(6)	계명대학교 동산병원	대구광역시 달서구 달구벌대로 1035	1577-6622
61		영남대학교병원	대구광역시 남구 현충로 170	1522-3114
62		칠곡경북대학교병원	대구광역시 북구 호국로 807	053-200-2114
63		대구파티마병원	대구광역시 동구 아양로 99	1688-7770
64		대구가톨릭대학교병원	대구광역시 남구 두류공원로17길 33	1688-0077
65	인천	길의료재단길병원	인천광역시 남동구 남동대로774번길21 (구월동)	1577-2299
66		가톨릭관동대학교 국제성모병원	인천광역시 서구 심곡로 100번길 25	1600-8291
67		가톨릭대학교 인천성모병원	인천광역시 부평구 동수로 56	1544-9004
68		인하대학교의과대학부속병원	인천광역시 중구 인항로 27	032-890-2114
69	광주	전남대학교병원	광주광역시 동구 제봉로42	1899-0000
70		조선대학교병원	광주광역시 동구 필문대로 365	062-220-3114
71		광주기독병원	광주광역시 남구 양림로 37	062-650-5000
72	대전	충남대학교병원	대전광역시 중구 문화로282	1599-7123
73		가톨릭대학교 대전성모병원	대전광역시 중구 대흥로 64	1577-0888
74		대전을지대학교병원	대전광역시 서구 둔산서로 95	042-611-3000
75		건양대학교병원	대전광역시 서구 관저동로 158	1577-3330
76	울산	울산대학교병원	울산광역시 동구 방어진순환도로 877	052-250-7000
77		울산동강병원	울산광역시 중구 태화로239	052-241-1114
78	강원	강릉아산병원	강원도 강릉시 사천면 방동길38	033-610-4111
79		강원대학교병원	강원도 춘천시 백령로156	033-258-2000
80		한림대학교춘천성심병원	강원도 춘천시 삭주로 77	033-240-5000
81		원주세브란스기독병원	강원도 원주시 일산로 20	033-741-0114
82	충북 (1)	충북대학교병원	충청북도 청주시 서원구 1순환로 776(개신동)	042-269-6114
83	충남	단국의대부속병원	충청남도 천안시 동남구 망향로201	1588-0063
84		순천향대학교 부속 천안병원	충청남도 천안시 동남구 순천향 6길 31	041-570-2114
85	전북	전북대학교병원	전라북도 전주시 덕진구 건지로201	1577-7877
86		예수병원	전라북도 전주시 완산구 서원로 365	063-230-8114
87		원광대학교병원	전라북도 익산시 무왕로 895	1577-3773
88	전남	화순전남대학교병원	전라남도 화순군 화순읍 서양로 322	1899-0000
89		성가롤로병원	전라남도 순천시 순광로 221	061-720-2000
90	경남	양산부산대학교병원	경상남도 양산시 물금읍 금오로20	1577-7512
91		경상대학교병원	경상남도 진주시 강남로 79	055-750-8000
92		삼성창원병원	경상남도 창원시 마산회원구 팔용로 158	055-233-8899
93		창원경상대학교병원	경상남도 창원시 성산구 정자로 11	055-214-1000
94		창원파티마병원	경상남도 창원시 의창구 창이대로 45	055-270-1000
95	제주	제주대학교병원	제주특별자치도 제주시 아란13길15 (아라일동)	064-717-1114
96		제주한라병원	제주특별자치도 제주시 도령로 65번지	064-740-5000

〈선별진료소 직접방문시〉




1. 문진표 작성
2. 의료진 판단에 따라 코로나 19검사 또는 동시 검사 시행
3. 검사 결과에 따라 환자 안내

검사 결과	환자 안내
코로나 19 (+) 인플루엔자 (+)	격리입원 치료
코로나 19 (+) 인플루엔자 (-)	
코로나 19 (-) 인플루엔자 (+)	의료기관 방문 안내
코로나 19 (-) 인플루엔자 (-)	

20) ‘코로나19-인플루엔자 동시유행 대비 일반 의료기관 진료절차 안내’(‘20.11, 중앙방역대책본부)

〈의료기관에서 검사의뢰 시〉



1. (검사의뢰서) 일반 의료기관에서 코로나 19 검사 의뢰서를 작성해 온 경우, 문진표 작성 단계 생략, 검사 의뢰서에 명시된 검사(코로나 19 또는 동시검사) 시행

2. (검사 결과에 따라 환자 안내) 의료기관에서 선제적 항바이러스제를 처방*받아 온 경우

* 11월 19일부터 인플루엔자 의심환자는 유행 여부와 관계없이 의사 판단에 따라 선제적으로 항바이러스제 처방 가능, 경구 항바이러스제에 한해 소아·고령자·면역저하자에게 우선적으로 건강보험 급여 적용

검사 결과	환자 안내
코로나 19 (+) 인플루엔자 (+)	격리입원 치료 안내
코로나 19 (+) 인플루엔자 (-)	격리입원 치료 안내(항바이러스제 중단)
코로나 19 (-) 인플루엔자 (+)	항바이러스제 복용 지속
코로나 19 (-) 인플루엔자 (-)	의료기관에 문의

※ 코로나 19(-), 인플루엔자 (+) 인 환자에서 항바이러스제를 처방받지 않은 경우 의료기관 진료 안내